Bijsluiter

Prednisolone 5 mg

5 mg prednisolon acetaat per tablet

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
NL- 3449 JA Woerden
Tel.: 0031-348416945
Fax: 0031-348483676
e-mail: alfasan@wxs.nl

Gehalte aan werkzaam bestanddeel:
Prednisolon acetaat 5 mg/tablet

Indicaties:
- Orthopedische aandoeningen van inflammatoire aard zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, artrose, myositis, synovitis;
- Allergische aandoeningen van het respiratie apparaat zoals astma bronchiale;
- Allergische aandoeningen van de huid zoals allergische dermatiden en met jeuk gepaard gaande dermatosen;
- Auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis of SLE;
- Ernstige acute infecties in combinatie met specifiek gericht antimicrobiële behandeling zoals bij huidinfecties, meningitis, encefalitis en ooginfecties.

Contra-indicaties:
- Virusinfecties;
- Diabetes mellitus;
- Osteoporose;
- Hartafwijkingen;
- Nierafwijkingen;
- Schimmelinfecties;
- Cornea ulcera;
- Brandwonden
- Toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen:
- Mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
- Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
- Bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsuffiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
- Katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
- Osteoporose;
- Remming van de lengtegroei van beenderen;
- Huidatrofie;
- Diabetes mellitus;
- Polyurie, polydipsie
- Polyfagie;
- Euforie;
- Ulceraties in het gastro-intestinale systeem;

- Pancreatitis;
- Hyperlipidaemie;
- Toename van de lipolysis;
- Vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
- Remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;
- Afname van de thyroïd synthese;
- Toename van de parathyroïd synthese;
- Morbus Cushing.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg
Oraal:
-Bij acute aandoeningen:0,5 – 4 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht per dag;
-Bij chronische aandoeningen:
2 – 4 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen;
vervolgens 1 – 2 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen;
vervolgens 1 – 2 mg prednisolonacetaat per kg lichaamsgewicht om de andere dag;
met intervallen van een week wordt de dosering dan nog gehalveerd, tot de minimaal werkzame dosering wordt bereikt.
- Hond om 8.00 's morgens en kat om 22.00 's avonds doseren in verband met het verschil in dagritme.

Wachttijd:
N.v.t.

Bewaring:
Beneden 25° C en in het donker.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen:
Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan:
Ongebruikte geneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien:
22-05-2012

Overige informatie:
100 x 10 tabletten in een aluminium/kunststof blisterverpakking in een kartonnen doos.

REG NL 1752 UDA

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.